Campaña Nacional de Inmunización Infantil

Ámelos, Protéjalos, Vacúnelos.

1-800-232-4636

2008 Vacunas recomendadas para sus bebés

al nacer	HepB
2 meses	HepB (1-2 meses) + DTaP + PCV + Hib + Polio + Rota
4 meses	DTaP + PCV + Hib + Polio + Rota
6 meses	HepB (6-18 meses*) + DTaP + PCV + Hib + Polio (6-18 meses *) + Rota + (Influenza) (6-59 meses/temporal**)
12 meses	MMR (12-15 meses*) + PCV (12-15meses*) + Hib (12-15 meses*) + Varicela (12-15 meses*) + HepA (12-23 meses*) + (Influenza) (6-59 meses/temporal**)
15 meses	DTaP (15-18 meses*) + (Influenza) (6-59 meses/temporal**)

Descripción de la Vacunas:

HepB: protege contra la infección por el virus de la hepatitis B

DTaP: protege contra la difteria, el tétano y la tos ferina

Hib: protege contra las infecciones por *Haemophilus influenzae* Tipo b, incluyendo meningitis bacteriana

PCV: protege contra la infección neumocócica

Polio: protege contra la poliomielitis; esta vacuna se conoce también como IPV

Rota: protege contra las infecciones causadas por el rotavirus

Influenza: protege contra la gripe

MMR: protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola (sarampión alemán)

Varicela: protege contra la varicela

HepA: protege contra la infección por el virus de la hepatitis A

NOTA: Si le falta una vacuna, no necesitará comenzar de nuevo, solo vuelva al doctor para la próxima vacuna. El doctor le ayudará a mantener al día las vacunas de sus niños.

* Esta vacuna se debe poner en este rango de edad.

** La influenza es una vacuna temporal. Todos los niños entre las edades de 6 a 59 meses deben recibir la vacuna contra la gripe cada año. Aquellos que reciban esta vacuna por primera vez deben recibir dos dósis con un intérvalo de 4 semanas. Aquellos que reciban una dósis en la primera temporada, deben recibir dos dósis en la próxima temporada.

Para más información, llame gratis al 1-800-232-4636

o visite www.cdc.gov/vaccines

Adaptado del Calendario de Vacunación para Bebés producido por Immunization Action Coalition y por el Calendario Recomendado de Vacunación del 2008 para personas de las edades entre 0 a 6 años aprobado por el Comité Consultivo sobre Prácticas de Vacunación, la Academia de Pediatría de los Estados Unidos y la Academia de Médicos de Familia de los Estados Unidos.